

BÓR 150



HNOJIVO ES, Boroethanolamin se stopovou živinou, bórem, B

11,0 % (v/v) B	vodorozpustný bór	150 g/l
----------------	-------------------	---------

Zvláštní pokyny pro používání: Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování! Používá se formou mimokořenové výživy, postřikem na list.

Obsah balení: 27,2 kg • 680 kg • 1360 kg (tj. 20 litrů • 500 litrů • 1000 litrů).

Výrobce: AGRA GROUP a.s., Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika.

Podmínky skladování: Skladujte v originálních obalech při teplotě **-25 °C až +30 °C** na chladném a dobře větraném místě. Skladujte mimo dosah dětí (S2), odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13).

Maximální množství vrstev při skladování: Kanystry 21 dm³: 3 vrstvy • kontejner 1 m³: 2 vrstvy.

Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Rozsah a způsob použití: Dávkování **0,7-4,1 kg/ha** (tj. 0,5-3 litry/ha).

Při aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku 1%.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Připravenou postřikovou jichu za stálého míchání ihned aplikujeme až do úplného spotřebování.

Přídavkové listové hnojivo **BÓR 150** je určeno do společných aplikací s listovými hnojivy CAMPOFORT® a FORTESTIM®, kromě hnojiv, která obsahují vápník (Ca) a mangan (Mn), pro případy velmi hlubokého nedostatku bóru v rostlinách.

Tabulka mísitelnosti přídavkového hnojiva BÓR 150 s listovými hnojivy CAMPOFORT® a FORTESTIM®

Druh listového hnojiva	Mísitelnost	Druh listového hnojiva	Mísitelnost
RETAPOS	ano	CAMPOFORT® Garant K	ano
CAMPOFORT® Fosfamid	ne	CAMPOFORT® Garant Ca	ne
FORTESTIM® - alfa	ano	CAMPOFORT® Special B	ano
FORTESTIM® - beta	ano	CAMPOFORT® Special Mn	ne
FORTESTIM® - gama	ano	CAMPOFORT® Special Zn	ano
FORTESTIM® - delta	ano	CAMPOFORT® Special Fe	ano
CAMPOFORT® Plus	ano	CAMPOFORT® Ultra Ca	ne
CAMPOFORT® Forte	ano	CAMPOFORT® Ultra B	ano
CAMPOFORT® Garant P	ano	CAMPOFORT® Ultra Fe	ano

Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku mísitelnosti. Hnojivo **BÓR 150** přidáváme jako poslední složku.

Obsah rizikových prvků v hnojivu nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb. (Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Dodržujte zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omyjte pokožku rukou teplou vodou a mýdlem. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Používejte ochranné rukavice a obličejový štít/brýle (S37/39).

První pomoc:

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26).

Při požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, zabraňte aspiraci zvratků. Při zvracení zajistěte, aby byla hlava níže než tělo. Vždy zajistěte lékařské ošetření.

Při styku s kůží: Odstraňte zasažený oděv. Umyjte velkým množstvím studené vody, pak bez mechanického dráždění umyjte zasažená místa teplou vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

AGRA servis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Zbytky přípravku (případně oplachovou vodu) shromážděte k opětovnému použití jako hnojiva.

Výrobek je uváděn do oběhu v souladu s požadavky Nařízení (ES) č. 2003/2003 O hnojivech ze dne 13.10.2003 ve znění pozdějších předpisů. Výrobek odpovídá typu, uvedenému v odstavci E.1.1.d Přílohy 1 Nařízení.

Datum výroby/číslo výrobní šarže: