

Agrotechnické charakteristiky

Odrůda	Ošetření fungicidy	Potřeba morforegulátoru při vyšší intenzitě pěstování v dávce	Pozdní setí	Citlivost na obilní předplodinu
Absolut	1× - 2×	střední	NE	NE
Alcantara	2×	nižší	NE	NE
Arkeos	2×	střední až vyšší	NE	NE (kromě kukuřice)
Askaban	2×	střední	ANO	NE
Avenue	2×	nižší	NE	NE
Bodyček	2×	střední až vyšší	NE	NE
Bohemia	1× - 2×	střední	ANO	NE
Bonanza	1×	nižší	ANO	NE
Brilliant	2×	nižší	ANO	NE
Butterfly	1× - 2×	střední	ANO	ANO
Crossway	2×	střední	NE	NE
Dagmar	2×	střední	ANO	NE
Fenomen	2×	nižší	ANO	NE (kromě kukuřice)
Frisky	1× - 2×	nižší až střední	ANO	NE
Genius	2× - 3×	střední	ANO	NE (kromě ječmene)
Illusion	2×	nižší	ANO	NE
Johnson	1×	nižší	ANO	NE
Julie	2×	vyšší	ANO	NE
Kalbex	2×	střední	ANO	NE
LG Absalon	2×	střední	NE	NE
LG Imosanto	2×	nižší	NE	NE
LG Magirus	2×	střední až vyšší	ANO	NE
LG Mocca	2×	střední až vyšší	ANO	NE
LG Mondial	1× - 2×	nižší	NE	NE
LG Orlice	2×	nižší až střední	ANO	NE
LG Rozarka	2×	nižší	NE	NE
Moschus	1× - 2×	nižší	ANO	NE
Norin	2×	nižší	NE	NE
Pallas	2×	střední	ANO	NE
Patras	2×	střední až vyšší	ANO	NE (kromě kukuřice)
Piruetta	1×	nižší	NE	NE
Ponticus	2×	nižší	ANO	NE
Revolver	1× - 2×	střední	ANO	NE
RGT Borsalino	1× - 2×	nižší	ANO	NE
RGT Depot	2×	nižší	ANO	NE
RGT Reform	2×	střední	ANO	NE
RGT Ritter	2×	nižší	ANO	NE
RGT Sacramento	2×	nižší	NE	NE
Skif	1× - 2×	nižší	ANO	ANO
SU Tarroca	2×	střední	ANO	NE (kromě kukuřice)
Tobak	2×	střední	ANO	NE (kromě kukuřice)
Turandot	1× - 2×	střední	ANO	NE
Vanessa	2×	nižší	ANO	NE (kromě kukuřice)
Viriato	2× - 3×	nižší	NE	NE (kromě kukuřice)

Tyto agrotechnické charakteristiky jsou převzaty z materiálů a doporučení jednotlivých firem a jsou pouze orientační.

Je třeba zohlednit stav porostu z pohledu vlivu ročníku a odrůdy, intenzity pěstování a infekčního tlaku chorob, neboť počet fungicidních vstupů může být vyšší.