SORTIMENT HYBRIDŮ KUKUŘICE OSEVA BZENEC

HYBRID **POČET ZRN 90 000**	FAO		TYP		SMĚR VYUŽITÍ	OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ (TIS. ROSTLIN/HA)	OPTIMÁLNÍ HUSTOTA ZRNO (TIS. ROSTLIN/HA)	ODOLNOST		ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ
	ZRNO	SILÁŽ	HYBRIDU	ZRNA				SUCHO	CHLAD	
Pyroxenia		130	Tc	M	S	120–130	100	↓↓↓		RD
Beania		160	Tc	M	S	100–110		↓↓↓		RD
Cewel	180	180	Tc	TM	S, Z	100–105	90	↓↓↓	ANO	RMZ
Cebesto		220	Sc	TM	S, BP	90–95		↓↓↓		RMZ
Celuka		220	Tc	TM	S, BP	85–95		↓↓	ANO	RMZ
Landlord	220	220	Sc	TM	S, Z, BP	85–90	85	↓↓↓	ANO	SG
Cefox		230	Tc	MD	S, BP	85–90		↓↓↓	ANO	RD
Cebert	230	230	Tc	MD	S, Z, BP	90–95	85–90	↓↓↓	ANO	RMZ
Cebir		240	Sc	M	S, BP	85–90		↓↓↓	ANO	RMZ
Cetip		240	Tc	M	S, BP	85–90		↓↓↓	ANO	RMZ
Alombo	240	240	Sc	M	S, Z, BP	85–90	80	↓↓↓	ANO	SG
Javelo	240	240	Sc	TM	S, Z, BP	85–95	80–85	↓↓	ANO	SG
Cesone	250	250	Sc	TM	S, Z, BP	85–90	80	↓↓↓	ANO	RMZ
Celong	250	250	Sc	MD	S, Z	85–90	80	↓↓↓		RMZ
Mondstein	250	250	Sc	M	S, Z, BP	85–90	80	↓↓↓	ANO	SG
Celio 250		250	Dc	MD	S, BP	85–90		↓↓↓		RMZ
Cejove		260	Tc	TM	S, BP	85		↓↓↓		RMZ
Cemora		260	Sc	M	S, BP	85		↓↓↓	ANO	RMZ
Cegoja		260	Sc	M	S, BP	80–85		↓↓↓	ANO	RMZ
Schwarzenegger	260	260	Sc	M	S, Z, BP	80–85	80	↓↓↓	ANO	SG
Cegut	260	260	Sc	MD	S, Z, BP	80–85	80	↓↓↓		RMZ
Aniska	270	270	Tc	M	S, Z, BP	80–85	80–85	↓↓↓		SG
Cekras	270	270	Sc	MD	Z, S	85	80	↓↓↓	ANO	RMZ
Cegrand	280	280	Sc	M	Z, S, BP	80–85	80	↓↓		RMZ
Cefin		290	Tc	MD	S	80–85		↓↓↓		SG
Ceranka	300	300	SC	D	Z, S	80–85	75–80	↓↓	ANO	RMZ
Centa		300	Sc	D	S, BP	80–85		↓↓	ANO	RMZ
Cenzus	300	300	Tc	MD	Z, S	80–85	75–80	↓↓↓		RMZ
Ceplan	300	300	Sc	MD	S, Z, BP	80–85	75–80	↓↓	ANO	RMZ
Zirkon	310	310	Sc	D	S, Z, BP	80–85	75–80	↓↓↓		SG
Cejih	320		Sc	D	Z		70–75	↓↓↓		RD
Cevaha		320	Sc	D	S, BP	80–85		↓↓↓	ANO	RMZ
Cewat		330	Sc	M	S, BP	80–85		↓↓	ANO	RMZ
Ze Zelstar	330	330	Sc	D	Z, S, BP	72–75	65–70	↓↓↓		RMZ
Ceefekt		340	Sc	D	S, BP	80–85		↓↓	ANO	RMZ
Celate		340	Sc	MD	S, BP	80–85		↓↓↓	ANO	SG
Ze Zeamax	420	420	Sc	D	Z, S, BP	72	65	↓↓↓		SG

TYP HYBRIDU:
SC – DVOULINIOVÝ → **MSC** – MODIFIKOVANÝ DVOULINIOVÝ
TC – TŘÍLINIOVÝ → **DC** – ČTYŘLINIOVÝ HYBRID

TYP ZRNA:
D – KOŇSKÝ ZUB (DENT) → **MD** – MEZITYP AŽ KOŇSKÝ ZUB
M – MEZITYP → **TM, FM** – TVRDÝ AŽ MEZITYP
MF – MEZITYP AŽ TVRDÝ → **F** – TVRDÝ TYP (FLINT)

SMĚR VYUŽITÍ:
S – SILÁŽ → **Z** – ZRNO → **LKS** – SILÁŽOVANÁ DRŤ KUKUŘIČNÝCH PALIC S LISTENY → **BP** – BIOPLYNOVÁ STANICE → **BE** – BIOETHANOL

ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ ROSTLINY:
SG – STAY GREEN → **RMZ** – ROVNOMĚRNĚ DOZRÁVAJÍCÍ
RMZ* – ZPOMALENÝ NÁRŮS SUŠINY V DOBĚ DOZRÁVÁNÍ
PZ – POZVOLNÉ DOZRÁVÁNÍ → **RZ, RD** – RYCHLE DOZRÁVAJÍCÍ

N NOVINKA
PŘIPRAVUJEME